

Coreopsis SunKiss

(*Coreopsis grandiflora*)

Многолетние растения (обновлено 11.01.21)

Общая информация

Расположение	Период цветения	Высота	Ширина	Расстояние между растениями
Солнечное	Поздняя весна, Лето, Позднее лето	12-14 в . (30-36 cm)	14-16 в . (36-41 cm)	20 в . (51 cm)

Проращивание

Форма семян	Рекомендуемый размер посевной кассеты	Семян в ячейке	До пикировки (недель)	дней от проращивания 50% сеянцев, до максимального проращивания	pH/EC (1:2) субстрат для посева	Присыпание семян
PRM	288 128*	1-2 2-4	5-7 7-8	3-5	5,8-6,2 pH 0,75 mmhos/cm	Слегка присыпать

* Рекомендуемый размер посевной кассеты для выгонки

Производство сеянцев

	Стадия 1	Стадия 2	Стадия 3	Стадия 4
Увлажнение	Уровень 4	Уровень 3-4	Уровень 2-3	Уровень 1-2
Температура	65-68°F (18-20°C)	65-68°F (18-20°C)	60-65°F (16-18°C)	60-65°F (16-18°C)
Освещенность	Опционально	6-8 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	8-10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹	8-10 mol·m ⁻² ·d ⁻¹
Подкормки		Менее 100ppm N (Менее 0.7 EC)	от 100 до 175 ppm N (от 0.7 до 1.2 EC)	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)

Охлаждение

Нет

Выращивание до получения готового растения

Выращивание при температуре	pH/EC (1:2) субстрат для выращивания	Подкормки	Длина дня
(день) 60-70°F (16-21°C) (ночь) 55-60°F (13-16°C)	5,8-6,2 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	от 175 до 225 ppm N (от 1.2 до 1.5 EC)	Требуется длинный день

Расчет выхода готовой продукции

Тип продукции	Размер посадочной емкости	Сеянцев/горшок	Период выращивания	Сезон	Регуляторы роста
Однолетник	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	9-10 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 72°F (22°C)	даминозид 5 000 ppm Опрыскивание
Выгонка	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	9-10 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 72°F (22°C)	даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание
Выгонка	4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	10-11 (неделя)	Осень, СДТ(средняя дневная температура) 72°F (22°C)	даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	10-11 (неделя)	Поздняя весна, СДТ(средняя дневная температура) 72°F (22°C)	даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание
Выгонка	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	10-11 (неделя)	Осень, СДТ(средняя дневная температура) 72°F (22°C)	даминозид 2 500-5 000 ppm Опрыскивание
Однолетник	5"/6"/1 Gallon	1-3 (ppp)	10-11 (неделя)	Лето, СДТ(средняя дневная температура) 72°F (22°C)	даминозид 5 000 ppm Опрыскивание

ПРИМЕЧАНИЕ: Производители рассады должны использовать данную информацию только как базовые принципы выращивания. PanAmerican Seed рекомендует проведение предварительных испытаний сортов, в конкретных условиях производителя. Период выращивания зависит от климатических условий, времени года, расположения производства и условий в теплице. Производитель несет ответственность за изучение и соблюдение существующих информационных материалов касающихся конкретной продукции. Любая информация указанная в данном материале не может считаться гарантией или гарантией PanAmerican Seed на любые продукты перечисленные здесь. Условия продажи PanAmerican Seed распространяются на все продукты указанные в данном материале.

Фотографии сорта



SunKiss



SunKiss



SunKiss



SunKiss



SunKiss

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2023 Ball Horticultural Company