

Torenia Kauai™ Serie

(Torenia fournieri)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 20-02-23)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Schaduw, Half schaduw	Late voorjaar, Zomer	8 in. (20 cm)	8 in. (20 cm)	8 in. (20 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Aantal dagen van 50% tot maximale kieming	pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
PEL	288	1	5-6	4-6	5,5-6,0 pH 0,75 mmhos/cm	Nee

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3	Niveau 3-4	Niveau 3-4
Temperatuur	71-76°F (22-24°C)	68-73°F (20-23°C)	68-70°F (20-21°C)	65-67°F (18-19°C)
Licht	Licht	2.500 f.c. (26.900 Lux)	2.500 f.c. (26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 65-70°F (18-21°C) (nacht) 62-64°F (17-18°C)	5,8-6,2 pH 1,5-2,0 mmhos/cm	175 tot 225 ml N (EC 1,2 tot 1,5)	Daglengteneutraal

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
Multiplaat/Tray (Cup Pack)	1 (ppp)	5-6 (weken)	Voorjaar	chloormequat chloride 500-700 ppm Spuiten
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	6-7 (weken)	Voorjaar	chloormequat chloride 500-750 ppm Spuiten

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Groeiregulatie is niet nodig. Groeiregulatie: Chloormequat (Cycocel) kan 2 weken na het oppotten in een dosering van 500 tot 750 mg/l (4,2 tot 6,4 ml/l 11,8%-formulering of 0,7 tot 1,0 ml/l 75%-formulering) worden gebruikt. Herhaal deze behandeling indien nodig. Spuiten met paclobutrazol (Bonzi) in een dosering van 20 tot 30 mg/l (5,0 tot 7,5 ml/l 0,4%-formulering) kan ook, maar is iets minder effectief dan chloormequat (Cycocel). Gebruik geen daminozide (B-Nine/Alar) of een tankmix van B-Nine/Cycocel, aangezien B-Nine de bloemkleur fletser maakt. B-Nine vertraagt ook de bloei.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffende middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Blue & White



Burgundy



Deep Blue



Lemon Drop



Magenta



Rose



White



Mixture

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and ® denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2023 Ball Horticultural Company