

Dichondra Silver Falls

(*Dichondra argentea*)

Teelt van eenjarigen (herzien/aangepast 27-01-22)

Algemene informatie

Blootstelling	Bloeiperiode	Hoogte	Breedte	Plantafstand
Half schaduw, Zon	-	2-3 in. (5-8 cm)	36-48 in. (91-122 cm)	18-48 in. (46-122 cm)

Kieming

Zaadproductvorm	Aanbevolen plugmaat	Zaden/plug	Duur pluggenteelt (in weken)	Aantal dagen van 50% tot maximale kieming	pH-/EC-waarden (1:2) zaaisubstraat	Afdekken van het zaad
RAW	288	1-2	5	4-5	5,5-6,3 pH 0,75 mmhos/cm	Lichte afdekking

Pluggenteelt

	Ontwikkelingsstadium 1	Ontwikkelingsstadium 2	Ontwikkelingsstadium 3	Ontwikkelingsstadium 4
Vochtigheid substraat	Niveau 4	Niveau 3-4	Niveau 2-3	Niveau 2-3
Temperatuur	72-76°F (22-24°C)	65-72°F (18-22°C)	65-70°F (18-21°C)	62-65°F (17-18°C)
Licht	Optioneel	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	1.000-2.500 f.c. (10.800-26.900 Lux)	2.500-5.000 f.c. (26.900-53.800 Lux)
Bemesten		Minder dan 100 ml N (EC lager dan 0,7)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)	100 tot 175 ml N (EC 0,7 tot 1,2)

Groeiregulatoren

daminozide/2.500 ppm/Spuiten

Bemestingsaanbeveling

Dien bij het verschijnen van de kiemwortel 50 tot 75 mg/l N toe als mengmeststof 15-0-15. Verhoog wanneer de kiembladen zich ontvouwen de stikstofgift naar 100 tot 175 mg/l.

Belangrijke tips voor vermeerdering

Spuit een week voor het oppotten met 2,5 g/l daminozide (B-Nine) om de vertakking te bevorderen. Groeit het best bij warme, droge teeltomstandigheden. Bemest licht. Spoel het blad af na het bemesten om verbranding te voorkomen.

Teelt tot eindproduct

Teelttemperatuur	pH-/EC-waarden (1:2) teeltsubstraat	Bemesten	Daglengte
(dag) 65-75°F (18-24°C) (nacht) 62-65°F (17-18°C)	5,5-6,5 pH 1,2-1,5 mmhos/cm	175 tot 225 ml N (EC 1,2 tot 1,5)	-

Teeltplanning

Potmaat / Containermaat	Planten per pot	Teeltduur	Seizoen	Groeiregulatoren
4"/4,5"/Quart	1 (ppp)	6-7 (weken)	Voorjaar	tank mix met daminozide/chloormequat chloride 5.000/1.000 ppm Spuiten
5"/6"/1 Gallon	3 (ppp)	7-8 (weken)	Voorjaar	tank mix met daminozide/chloormequat chloride 5.000/1.000 ppm Spuiten
12" Pot of HB/5 Gallon	5 (ppp)	7-9 (weken)	Voorjaar	tank mix met daminozide/chloormequat chloride 5.000/1.000 ppm Spuiten

Belangrijke tips voor teelt eindproduct

Groeit het best bij warme, droge teeltomstandigheden. Bemest licht. Spoel het blad af na het bemesten om verbranding te voorkomen. Hogere lichtniveaus zorgen voor meer zilverachtig blad en kortere internodiën.

OPMERKING: Telers dienen de hier verstrekte informatie te beschouwen als een richtlijn. PanAmerican Seed adviseert telers verschillende producten onder de eigen groeiomstandigheden uit te proberen. De teeltduur kan variëren al naar gelang het klimaat, de situering, de tijd van het jaar en andere externe omstandigheden. Het is de verantwoordelijkheid van de teler te controleren of het product in het betreffende land toegestaan is. Tevens dienen de voor het desbetreffend middel geldende regels zoals die op het etiket staan vermeld strikt gelezen en nageleefd te worden. Niets in deze teelthandleiding kan worden beschouwd als een waarborg of garantie van PanAmerican Seed met betrekking tot alle hierin vermelde producten. Op alle hierin genoemde producten zijn de algemene verkoopvoorwaarden van PanAmerican Seed van toepassing.

Foto's ras



Silver Falls



Silver Falls



Silver Falls



Silver Falls



Silver Falls



Silver Falls



Silver Falls

PanAmericanSeed™

PanAmerican Seed Co.
622 Town Road, West Chicago, Illinois, USA, 60185-2698
630 231-1400 Fax: 630 231-3609 PanAmSeed.com

™ denotes a trademark of and © denotes a registered trademark of Ball Horticultural Company in the US. It may also be registered in other countries.
©2023 Ball Horticultural Company