



Cultuurbeschrijving Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

ANETHUM

Grondsoort

Dille groeit goed op vrijwel alle grondsoorten. Op veengronden wordt het gewas slap.

Bloeispreiding

Buiten is de bloei te spreiden door het zaaitijdstip te wijzigen. Zaaïen is mogelijk van half april tot half juli. Het gewas bloeit dan van eind juni tot eind oktober. Eind juli zaaïen is mogelijk, maar zal alleen een goede oogst geven in een mooi najaar. Onder glas kan men bij dit zaaitijdstip in oktober bloei verwachten. Met de teelt onder glas is de bloei ook te vervroegen. In januari zaaïen geeft bloei in mei. Teelt in tunnels is ook mogelijk. Hiermee is ongeveer 10 dagen vervroeging te bereiken, wanneer eind maart gezaaid wordt. Vervroegen d.m.v. folie behoort ook tot de mogelijkheden. Wanneer men half maart zaaït, zal het gewas eind juni bloeien. Met 100 gram zaad kan men buiten 10 RR (140 m²) zaaïen, in de kas zaaït men dunner, n.l. per 100 gram 15 RR (210 m²), met een regelafstand van 25 cm.

- Steunen

Om te voorkomen dat het gewas gaat strijken is het telen in gaas, bijv. Alstroemeriagaas, aan te bevelen. Buiten wordt strijken, door wind en regen, hiermee zo veel mogelijk voorkomen. Bij de binnenteelt is het gewas slapper, zodat steunen ook noodzakelijk is. Een bespuiting kan het gewas doen strijken. Op open vlaktes is het gebruik vna een windkering aan te bevelen.

- Remmen

Er zijn mogelijkheden om het gewas kort te houden m.b.v. remstoffen. Het gewas groeit dan ook minder zwaar. Er kan gebruik gemaakt worden van Alar 64. Proefondervindelijk zal vastgesteld moeten worden welke concentratie men moet gebruiken en hoe vaak gespoten moet worden.

- Watergeven

Om strijken van het gewas te voorkomen, kan het beste onderdoor water worden gegeven. Om het gewas kort en stevig te houden moet men tijdens de teelt zo min mogelijk water geven.

- Oogsten

Dille kan geogst worden als de bloeiwijze goed op kleur is. Er wordt op water aangevoerd in bossen van 10 stuks.

- Ziekten en plagen

Controleer het gewas regelmatig op aantastingen, zoals luis en schimmelziekten en bestrijdt indien nodig. In akkerbouwgebieden bestaat een kans op aantasting door de wortelvlieg. De maden vreten aan de wortels van jonge planten, waardoor de planten afsterven.

-Onkruidbestrijding

Beperkte ervaring is opgedaan met Linuron, slechts proefsgewijs uitproberen